

## REMISSIONSKRITERIEN

<b>CR</b> (komplette Remission)	Verschwinden aller Krankheitszeichen (klinisch und radiologisch). In diesem Fall wird das Therapieergebnis als „CR mit vollständiger Rückbildung“ (kurz: <b>CR</b> ) bezeichnet.
<b>CRr</b> (komplette Remission mit residuellen Veränderungen)	Auch der Nachweis residueller radiologischer Veränderungen ( $\leq 1,5$ cm) ist grundsätzlich mit einer CR vereinbar, wenn sich ansonsten keine anderen Anhaltspunkte für Lymphomaktivität ergeben. In diesem Fall wird das Therapieergebnis als „CR mit residuellen Veränderungen“ (kurz: <b>CRr</b> ) bezeichnet. Die Festlegung auf <b>CR</b> oder <b>CRr</b> impliziert, dass keine über die protokollgerechte Therapie hinausgehenden therapeutischen Maßnahmen nötig sind.
<b>PR</b> (partielle Remission)	Eine PR liegt vor, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. weiterhin Vorliegen von Lymphomgewebe (radiologisch und klinisch) mit deutlicher Reduktion in <b>allen</b> Befallslokalisationen</li> <li>2. Rückbildung der Mehrzahl (<math>\geq</math> die Hälfte) der befallenen großen LK und umschriebenen messbaren Organmanifestationen (<math>&gt; 3</math> cm im Durchmesser) um mehr als 50% im größten <math>\emptyset</math> gegenüber dem Ausgangsbefund. Falls keine Läsion <math>&gt; 3</math> cm im <math>\emptyset</math> aufwies: Rückbildung der beiden größten befallenen Läsionen um <math>&gt;</math> als 50% im größten <math>\emptyset</math></li> <li>3. Rückbildung eines großen Mediastinaltumors um mind. 50% im größten <math>\emptyset</math></li> <li>4. sowie kein Vorliegen von B-Symptomen und/oder ansteigender oder stark erhöhter BSG</li> </ol>
<b>NC</b> (no change)	Weiterhin Vorliegen von Lymphomgewebe mit mäßiger Reduktion bzw. geringer Größenzunahme der Lymphome oder Organmanifestationen (Ausschluß von PRO und PR)  NC liegt vor, wenn: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kein Lymphom <math>&gt;</math> als 25% im größten <math>\emptyset</math> zugenommen hat</li> <li>2. die Erkrankungsrückbildung nicht die Kriterien einer PR erfüllt (d.h. entweder insgesamt zu geringe Rückbildung in allen oder unzureichende Rückbildung in einzelnen Lokalisationen und/oder eine stark erhöhte BSG und/oder B-Symptomatik vorliegt)</li> </ol>
<b>PRO</b> (Progress)	Ein PRO liegt vor, wenn: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>unter Therapie</u> neue Läsionen auftreten oder</li> <li>2. mindestens 1 bekannte Läsion <math>&gt;</math> als 25% im größten <math>\emptyset</math> unter Therapie oder <b>innerhalb</b> von <u>3 Monaten nach</u> Therapieende an Größe zugenommen hat</li> </ol>
<b>REZIDIV</b>	Auftreten neuer oder Wiedererscheinen initialer Tumorkläsionen oder B-Symptome nach CR, frühestens <b>nach 3 Monaten nach</b> Therapieende